

Origem: Nativa do Brasil, não sendo entretanto restrita ao país.

Distribuição Geográfica: Nordeste (Bahia), Centro-Oeste (Goiás), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).

Domínios Fitogeográficos: Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa.

Tipo de Vegetação: Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista.



Bougainvillea

Bibliografia sugerida:

ISLAM, M.Z.; HOSSAIN, M.T.; HOSSEN, F.; AKTER, M.S.; MOKAMMEL, M.A. *In-vitro* antioxidant and antimicrobial activity of *Bougainvillea glabra* flower. *Research Journal of Medicinal Plant*, v.10, n.3, p.228-236, 2016.

LORENZI, H. *Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil*. Nova Odessa, Piracicaba, São Paulo: Plantarum, 1992. Disponível em: <http://aeaesp.com.br/wp-content/uploads/2019/09/%C3%81rvore-Brasileiras-Lorenzi-volume-1-compactado.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2021.

OGUNWANDE, I.A.; AVOSEH, O.N.; OLASUNKANMI, K.N.; LAWAL, O. A.; ASCRIZZI, R.; FLAMINI, G. Chemical composition, antinociceptive and anti-inflammatory activities of essential oil of *Bougainvillea glabra*. *Journal of Ethnopharmacology*, v.232, p.188-192, 2019.