


Origem: Nativa do Brasil, com ocorrência restrita a um trecho do litoral do país. Trata-se de uma espécie endêmica da Mata Atlântica.

Distribuição Geográfica: Nordeste (Bahia), Sudeste (Espírito Santo).

Dominios Fitogeográficos: Mata Atlântica.

Tipo de Vegetação: Restinga.



Bibliografia sugerida:

BRITANNICA ESCOLA. Bromélia. Britânica Digital Learning, 2021. Disponível em: <https://escola.britannica.com.br/artigo/brom%C3%A9lia/483131>. Acesso em: 3 ago. 2021.

GUIMARÃES, M.G.A.; MARTINS, K.S.; CARVALHO, M.A.; KERSTEN, V.A.; VIEIRA, R.R.B.T.; MALECK, M. Ação dos extratos de *Neoregelia compacta* (Mez) L.B. Smith e *Aechmea fasciata* (Lindley) Baker sobre as formas imaturas de *Aedes* (*Stegomyia*) *aegypti*, Linnaeus, 1762. *Revista Fitos*, Rio de Janeiro, v.8, n.2, p.73-160, 2013.

LORENZI, H.; SOUZA, H.M. *Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e trepadeiras*. 3. ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2001.